Dale®
Medical Products

수술 후 브라

착용 방법

1. 띠를 분리하고 브라를 환자 밑에 놓아두십시오.
2. 브라의 양쪽을 꽉 잡고 함께 누르십시오. 약간의 팽팽함이 있어야 합니다.
3. 띠를 밴드의 상단에서 브라의 앞면에 붙이십시오.
4. 브라는 앞면과 띠에서 파스너를 벗겨 내어 쉽게 조절할 수 있습니다.



대안 착용법

Dale 수술 후 브라는 띠를 분리하지 않고 환자의 팔을 띠를 통해 살짝 빠져나가게 하여서도 사용할 수 있습니다.

세탁 및 관리

40C 세탁기를 사용하여 온수로 세탁하십시오.

빨랫줄 건조.

표백제 사용 금지.

다림질 금지.

드라이클리닝 금지.

단일 환자용. 1회용

도포 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

Dale은 미국, EU 및 영국에서 Dale Medical Products, Inc.의 등록 상표입니다.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, 미국
전화: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

942166 REV G

©Copyright 2024